


Menomazioni, disabilità ed handicap

Invecchiamento della BIOSFERA: salute, riserva funzionale, omeostasi

(adattato da Becker e Cohen, JAGS, 1984)




Invecchiamento della BIOSFERA: salute, riserva funzionale, omeostasi

(adattato da Becker e Cohen, JAGS, 1984)


LA SALUTE DEL CORPO

LA SALUTE DELLA PERSONA


Eterogeneità ecosistema della persona



Ambiente



B: area biologica




B: area biologica
+
P: area psicologica
+
S: area sociale


VMD misura stato funzionale:

$$\text{BiologicaF} \times \text{PsicocognitivaF} \times \text{SocialeF} = \text{StatoF}$$

$$\text{Bf} \times \text{Pf} \times \text{Sf} = \text{SF}$$



Piano Assistenziale Individuale




Rubenstein LZ, et al., 1983, 1995
Becker PM & Cohen HJ. 1984
WHO, ICIDH, 1980
Israël L, et al. 1984
ISTAT, Rapporto BES 2014
Belloi L, et al., 1992

Il Modello Bio-Psico-Sociale (BIOSFERA) Menomazioni, disabilità ed handicap

Engel G. L. (NEJM, 306:803; 1982)

TABELLA 26.1 Relazioni tra malattia e modello biopsicosociale. (Adattato da Engle G.L.: «N. Eng. J. Med.», 306: 803, 1982.)



Valutazione Multidimensionale Geriatrica

Rubenstein LZ e al., Effectiveness of a geriatric evaluation unit. A randomized clinical trial. N Engl J Med. 1984;311:1664-70.

AREA BIOLOGICA

Disturbo Neurocognitivo Maggiore ad eziopatogenesi degenerativa tipo Alzheimer¹, stadio grave (CDR 3), all'esordio clinico.

Cecità OD in meningioma sviluppatosi in zona parasellare, apice orbitario e processi clinoidi anteriore e posteriore destri ed inglobante il nervo attico nel tratto extraorbitario e prechiasmatico, non passibile di trattamento chirurgico.²

La paziente presenta instabilità ed elevato rischio di caduta e deambula con assistenza in quanto non è in grado di apprendere l'uso di ausili quali il deambulatore.

Incontinenza sfinterica urinaria (portatrice di ausili per l'assorbenza).

AREA PSICOLOGICA

STATO COGNITIVO. SPMSQ: 10/10 (v.n. = 0-2). compromissione orientamento temporale e spaziale, memoria a breve e lungo termine, attenzione-calcolo.

CDR (Clinical Dementia Rating): 3. [v.n.: 0; demenza dubbia: 0,5; lieve: 1; moderata: 2; **grave: 3**; molto grave: 4; terminale: 5].

STATO COMPORTAMENTALE. La paziente è mutacica, non è in grado di fornire nessuna risposta alla valutazione psicometrica e presenta segno della testa ruotata.

AREA FUNZIONALE

ADL. FUNZIONI VALUTATE: 6 → FUNZIONI PERSE: 6. Necessità di assistenza quotidiana e costante per tutte le 6 attività della vita quotidiana: 1) igiene completa 2) abbigliamento 3) uso dei servizi igienici 4) mobilità 5) incontinenza sfinterica 6) alimentazione (necessità di cibi tagliati, deve essere aiutata a prendere le posate ed il bicchiere).

IADL. FUNZIONI VALUTATE: 8 → FUNZIONI PERSE: 8 Necessità di assistenza quotidiana e costante per tutte le 8 attività strumentali della vita quotidiana: 1) gestire denaro 2) fare acquisti 3) preparare pasti 4) governare casa 5) fare bucato 6) usare mezzi di trasporto 7) di comunicazione 8) assumere farmaci.

AREA SOCIALE

Vedova, risiede al domicilio con assistenza continua fornita dalla figlia, nubile, che ha un lavoro compatibile con smart working.

VMD : architettura

[illegible]

(*) DATI CODIFICATI (**) DATI CODIFICATI IN SAGOME ANTROPOMORFE (§) Trasmissione informazioni: copia di CIRS; BINA; scheda del piano assistenziale infermieristico, tutelare e riabilitativo

