

UCLA Neuropsychiatric Inventory (NPI) (*)

	N.A.	Frequenza (a)					Gravità (b)			a x b	Distress Caregiver					
Deliri	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Allucinazioni	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Agitaz./aggressività	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Depressione/ disforia	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Ansia	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Euforia/ esaltazione	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Apatia/ indifferenza	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Disinibizione	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Irritabilità/ Labilità	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Attività motoria aberrante	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Sonno	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]	_____	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Disturbi appetito e alimentazione	[]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[1]	[2]	[3]		[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Frequenza

- 0=mai
- 1=raramente (meno di 1 volta alla settimana)
- 2=talvolta (almeno 1 volta alla settimana)
- 3=frequentemente (parecchie volte ma meno di 1 volta al giorno)
- 4=quasi costantemente (1 o più volte al giorno)

Gravità

- 1=lieve (non producono disturbo al paziente).
- 2=moderata (comportano disturbo per il paziente).
- 3=severa (richiedono la somministrazione di farmaci; sono molto disturbanti per il paziente).

Stress emotivo o psicologico del caregiver

- 0= Nessuno
- 1= Minimo
- 2= Lieve
- 3= Moderato
- 4= Severo
- 5= Grave

(*) Cummings J.L, et al (1994). The Neuropsychiatric Inventory. Comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology, 44; 12:2308