

S. A. (08-02-1930) Maschio; 77 anni, ingegnere, imprenditore, vive con la moglie : ha due figlie.

12-5-2007: rallentamento ideo-motorio: riferisce difficoltà ad usare i termini giusti quando parla, ad eseguire calcoli, a ricordare le cose recenti.

Buon camminatore abituale, di recente si affatica facilmente nel cammino (abituale visitatore di Venezia da anni; nell'ultimo viaggio ha anticipato il rientro perché non riusciva a fare i ponti).

Amnesie emergono nel riscontro con la moglie di eventi comuni ("sono caduto 2 anni fa.. invece erano 6 come conferma la moglie).

Non familiarità per demenza. Sonno regolare. Si alimenta normalmente.

Anamnesi silente tranne per glaucoma.

Es. Obiettivo: vigile, collaborante, eloquio spontaneo, congruo ed informativo ma fluenza ridotta, deambulazione nei limiti, non evidenti deficit stenici di lato, amimia, ipertono emisoma dx. soprattutto arto sup., non evidente bradicinesia né tremore.

Valutazione psico-cognitiva e funzionale

| | |
|---------------------|-------------------|
| | 1° 12-5-07 |
| MMSE | 25,7 / 30 |
| GPCOG | 4 / 9 |
| MOCA | / 30 |
| CDR | 0,5 |
| ADL (*) | 5 su 6 |
| IADL (*)(**) | 5 su 8 |

Indagini Diagnostiche

TAC cerebrale: "...ventricoli asimmetricamente dilatati sx. maggiore del dx. e spazi subaracnoidei ampi a configurare un quadro di atrofia cerebrale...". La RMN cerebrale ha dato esito sovrapponale alla TAC.

Vis. Cardiologica = ritmo sinusale a f. media di 75/b.m. , BBD; Esami biumorali : nella norma.

(*) funzioni conservate (**) = 3 funzioni non applicabili

Conclusioni. Sindrome cognitiva lieve in paziente con elevata riserva cognitiva. Possibile sindrome extrapiramidale.

Follow up : timeline

| | 2° 30-6-07 | 3° 28-9-07 (§) | 4° 09-2-08 (#) | 6° 05-8-08 | 9° 2009 | 15° 2010 |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| MMSE | 27,7 / 30 | 25,3 / 30 | 26,3 / 30 | 19,3 / 30 | 14,3 / 30 | 11,1 / 30 |
| GPCOG | 9 / 9 | 6 / 9 | 9 / 9 | 2 / 9 | | |
| MOCA | 19 / 30 | 18 / 30 | 23 / 30 | | | |
| CDR | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| ADL (*) | 5 su 6 | 6 su 6 | 6 su 6 | 6 su 6 | 1 su 6 | 1 su 6 |
| IADL (*)(**) | 5 su 8 | 5 su 8 | 5 su 8 | 0 su 8 | 0 su 8 | 0 su 8 |

(*) funzioni conservate (**) = 3 funzioni non applicabili (§) dopo 3 mesi di Aricept 5; (#) dopo 4 mesi di Aricept 10

Commento : elementi clinici, funzionali e comportamentali e psicometrici, evoluti da "sindrome cognitiva lieve" a "deterioramento cognitivo a genesi degenerativa". Progressiva perdita delle funzioni strumentali e di base fino alla completa dipendenza.